

- Rak grlića maternice nastaje na donjem dijelu maternice koji se otvara prema vagini/rodnici.
- Zapocinje kada se neke ćelije grlića maternice promijene i krenu da se umnožavaju na nekontrolisan način.
- **Redovni pregledi (skrining)** imaju za cilj da promjene na grliću maternice pronađu rano, prije nego što prerastu u rak, onda kada mogu lako dase otklone. Skrining se obavlja Papa testom.
- Sve žene, u dobi od 20. do 65. godine života treba da idu na redovne pregledе. U prvo vrijeme pregled bi se trebao raditi jednom godišnje.
- Nakon dva uzastopna negativna Papa testa, tj. uredna nalaza pregledi bi se trebali raditi svake tri godine.

Redovni pregledi putem skrininga omogućavaju otkrivanje promjenjenih ćelija grlića maternice u ranom stadiju, kada se mogu lako odstraniti, tako da se ne razviju u rak grlića maternice.

PREVENCIJA JE NAJAVAŽNIJA!

BUDI INFORMISANA NA VRIJEME, ZAŠTITI SVOJE ZDRAVLJE!

PREGLEDAJ SE!

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO T UZLANSKOG KANTONA



Ul. Tuzlanskog odreda 6 Tuzla;
Tel: 00387 35 307 700;
Fax: 256467; mail:
zavodzjz@bih.net.ba

RAK GRLIĆA MATERICE

Rana dijagnostika spašava život !



**Zavod za javno zdravstvo
Tuzlanskog kantona**

Šta je rak grlića maternice?

Rak grlića maternice nastaje na donjem dijelu maternice koji se otvara prema vagini/rodnici.

Zapocinje kada se neke ćelije grlića maternice promijene i krenu da se umnožavaju na nekontrolisan način.

Potrebno je više godina da se promijenjene ćelije vrata maternice iz početnih stadija razviju u rak grlića maternice.

Srećom, stadiji koji predhode raku se lako liječe. Međutim, kako ne pokazuju jasne znake bolesti, moguće ih je otkriti samo redovnim pregledima **Papa testom (skrining).**

Šta je skrining za rak grlića maternice?

Redovni pregledi tj. skrining omogućavaju otkrivanje promjenjenih ćelija grlića maternice u ranom stadiju, kada se mogu lako odstraniti, tako da se ne razviju u rak grlića maternice.

Normalan Papa test?

Većina žena ima normalan rezultat Papa testa. U tom slučaju rizik da dobijete rak grlića maternice je mali, ali je ipak neophodno nastaviti sa redovnim skrining pregledima.

Abnormalan Papa test?

Neke žene imaju abnormalan rezultat Papa testa. To samo znači da su u njihovom brisu nađene ćelije koje pokazuju neke promjene. Kod žena koje idu redovno na pregledе rijetko se Papa testom nađe rak.

Svi abnormalni rezultati zahtijevaju praćenje. U zavisnosti od rezultata, biće Vam savjetovana jedna od sljedećih mogućnosti:


- ponovni Papa test za tri do šest mjeseci,
- kolposkopija, detaljni pregled povećalom koji omogućava Vašem ginekologu detaljniji pregled grlića maternice.
- test za otkrivanje humanog papillomavirusa (HPV) koji uzrokuje rak grlića maternice.

Šta je kolposkopija?

Kolposkopija je pregled koji podrazumijeva upotrebu kolposkopa, aparata kojim je moguće vidjeti grlić

materice, vaginalnu i vulvarnu sluzokožu pod uvećanjem od 6 do 40 puta. Bezbolan je, a procenat dijagnostičke sigurnosti se podiže na preko 85%.

Kome se preporučuje



kolposkopija?

Rizičnu skupinu čine pacijentice sa graničnim ili abnormalnim Papa nalazom, pacijentice koje imaju HPV infekciju, pacijentice kod kojih je materica odstanjena u potpunosti, pacijentice sa netipičnim krvarenjem, ili pacijentice za koje citolog nakon PAPA brisa smatra da treba dodatne informacije o stanju grlića materice.